

PM

Rubrik: LIA till patienter som opereras med artroskopisk rekonstruktion av främre korsbandet i knäleden	
Enhet/förvaltning: Ortopedkliniken Blekingesjukhuset	Huvudområde/delområde: Läkemedel/Rutiner i samband med operation
Ansvarig: Tomas Ericson, verksamhetschef	Utfärdare: Cecilia Rönnfjärd, överläkare
Gemensamt med:	Version: 2.1
Godkänt datum: 2020-04-08	Nästa revidering: 2022-04-08

KOPIA

Alla patienter som genomgår operation artroskopisk rekonstruktion av främre korsbandet i knäleden kommer att erhålla lokalbedövning som en del av den postoperativa smärtlindringen. Målet med denna behandling är att optimera smärtlindringen samtidigt som postoperativ mobilisering underlättas och eventuellt kan tidigareläggas. Patienterna kommer liksom tidigare att opereras i generell narkos.

Utrustning

- 1 st 50 ml spruta
- 1 st 20 ml spruta
- 3 rosa uppdragningskanyler
- 2 gröna intramuskulärkanyler
- 1 sugkateter storlek 8

Injektionslösning 1 (blandas av operationssköterskan i 50 ml spruta)

- 40 ml Narop 2mg/ml = 80 mg
 - 1 ml Toradol 30 mg/ml = 30 mg
 - 0,2 ml Adrenalin 1 mg/ml = 0,2 mg
- Skall skrivas upp på "LIA-bedövningslappen" som finns inne på salen inklusive patientens namn och födelsedatum samt operationsdatum.

Injektionslösning 2 (i 20 ml spruta + grön intramuskulär kanyl)

- 20 ml Narop 2 mg/ml

Administrering

40 ml Narop, 1 ml Toradol och 0,2 ml adrenalin blandas av operationssköterska pre- eller peroperativt och dras upp i en 50 ml spruta.

20 ml ren Narop 2 mg/ml dras upp i en 20 ml spruta.

En sugkateter läggs upp (använd gudestiftet till interferensskruven i tibia som mandräng säkrad distalt med en peang) i kanalen efter tagna hamstringssenor.

Sluter sedan Sartoriusfascia och subkutis med hjälp av Vicryl.

Sprutar därefter 20 ml av injektionslösning 1 och dra därefter katetern.

KOPIA

De sista 20 ml injiceras intraartikulärt i knäleden med hjälp av avfödesportalen eller en grön uppdragningskanyl.

Injektionslösning 2 (20 ml ren Narop 2 mg/ml) injiceras efter sårförslutning i samtliga snitt och portaler.

Kontraindikationer mot ingående Toradol (skall då uteslutas)

NSAID-överkänslighet

Svår njurinsufficiens

Hjärtsvikt

Graviditet