

Tibiakondylfraktur

Hitta i dokumentet

[Preoperativt](#)
[Peroperativt](#)
[Postoperativt](#)

[Utskrivning](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Preoperativt

Hälsodeklaration:	Ifylld av patienten eller närstående.
Blod:	Bastest.
EKG:	> 65 år eller hjärtsjuk.
Prover:	Blodgrupp Hb, Tpk Lpk Na Ka Krea CRP.
Rtg:	Knä-underben.
Rtg cor/pulm:	Enl anestesis riktlinjer.
Trombosprofylax:	Inj Innohep enl riktlinjer.
Pre-op vätska	Ringer-Acetat 1000 ml Vid diabetes se riktlinjer för kirurgi och diabetes

Peroperativt

Antibiotikaprofylax:	Enl operatör
Gips:	Knäkappa, ev ortos.

Postoperativt

Uva / Iva:	Ett par timmar, sedan åter till avdelningen.
Gips:	Ev knäkappa.
Kontroller:	Distalstatus (känsl, värme och rörlighet) N. peroneus, droppfot. Temp x 1.
Mobilisering:	Ej belasta

Prover: Hb tills stabilt.

Rtg: Knä-underben.

Utskrivning

Gips: Gips sammanlagt ca 4 - 6 v.

Återbesök: 3v för suturtagning och byte av ev gips till SSK-
mott
6v till läkare.

Uppdaterat från föregående version

Utgåva 4. Ersätter 20120521