

Fotledsfraktur, pre, peri- och postoperativt LE

Kirurgi

Extern fixation av fotledsfraktur med platta och skruvar, orsakat av trauma.

Anestesiform

Generell anestesi med larynxmask. TCI eller Sevofluran/Fentanyl.

Värmetäcke och varm Ringeracetat.

Blodgruppering & bastest behövs ej.

Operationstid

30 - 60 min.

Operationsinstrument

Plocklista och operationsmall finns.

Antibiotikaprofylax

[Antibiotika - användning av - VO Kirurgi LE](#)

Operationsläge

Ryggläge.

Kudde under höften för att vinkla in foten.

Salsdisciplin

Låst sal med hjälm och munskydd för samtliga, implantat.

Förband

Mepilex Border, tacylvadd, Splint Eez postoperativ skena, elastalinda.

Smärtlindring:

Lokalanestesi av operatör, övrig smärtlindring enligt våra generella direktiv.

Postoperativt - kontroller

- Puls, blodtryck, saturation och andningsfrekvens var 15:e minut i 1 timme, därefter v b
- Kontroll av förband, förstärkas v b
- Kontroll av känsel/rörlighet/ färg på tårna
- Splint Eez postoperativ skena + kryckor
- Högläge av foten
- Kontrollera smärta ofta enligt VAS-skalan
- Bedömning enligt: [Utskrivningskriterier för uppvakningsavdelningen LE](#)

Utskrivning dagkirurgi

- Patienten skrivs ut av den ortoped som har opererat
- Utskrivningspapper: [Ortopedi - information efter operation - Lasarettet i Enköping](#)
- Vid behov, utskrivning via röntgen. Bilderna behöver ej granskas före hemgång.
- Patienten får träffa sjukgymnast i samband med återbesök
- 2–3 dagar postop får patienten byta till ett belastningsbart gips/stövel på gipsningssalen UAS.
- Suturtagning i regel 2 veckor efter hos DSK
- Återbesök 6 veckor postop till ortopedmottagningen UAS