

Suspekt postoperativ sårinfektion, rutiner på geriatrisk avdelning

Målgrupp

Geriatriska patienter i slutenvård som under aktuellt vårdtillfälle genomgått operation med ortopediskt implantat. Vid kliniska tecken på nytillkommen infektion i operationsområdet gäller följande:

Patienter inneliggande på geriatrisk avdelning på Akademiska sjukhuset

Vid misstänkt sepsis (hög feber/frossa/behov av snabb handläggning) och misstanke om sårinfektion

- a) Sök jourhavande läkare på infektionskliniken via växeln.
- b) Rundodla (sår-, urin-, NPH- och blod).
- c) Dagtid: Sök traumakonsulten "lilla T" via växeln om patienten är opererad för en fraktur.
Dagtid: Sök proteskonsulten "stora P" via växeln om patienten är opererad med en protes.
Jourtid: Sök ortopedjouren via växeln eller på sökarnummer 99925.

Vid misstänkt sårinfektion

- a) Ordinera sårodling, daglig kontroll av såret och tempmätning.
- b) Skicka elektronisk remiss till respektive sektion (trauma – lilla T, protes – stora P) för bedömning om djup infektion misstänks.
- c) Om det är aktuellt att sätta in antibiotika, kontakta ortopedjouren först för bedömning av såret. Behovet av djupa odlingar behöver bedömas innan antibiotika sätts in.

För patienter inneliggande på geriatrisk avdelning i Tierp

Kontakta extern traumakonsult "stora T" när det gäller frakturpatienter och proteskonsult "stora P" när det gäller protespatienter via växel på Akademiska Sjukhuset för diskussion om bedömning och handläggning enligt ovan.